



PELE SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Aktif Maddenin Adı : 200 g / l Boscalid +
100 g / l Kresoxim-methyl



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu (g/100 l su)	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Bağ*	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	30ml/100 l su	28
Domates (sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50ml/100 l su	3
Biber (sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50ml/100 l su	3
Kavun	Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fluginea</i>)	50ml/da	3
Şeftali	Külleme (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	30ml/100 l su	7
Çeltik	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100ml/da	42

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Külleme: 1. İlaçlama: çiçek öncesi sürgünler 25-30 cm boya erişince, 2. İlaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığı anda yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 3. Ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilir. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilmelidir.

Domates, biber (Serada): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrar edilir.

Kavun külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftali külleme: İlk ilaçlama sürgünlerin yaklaşık 20 cm uzunluğa ulaştığı dönemde yapılır. Hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Çeltik yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 28 gün sonra ilaçlama tekrarlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önerilen dozda ilaç ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

