



BENİTO WG

ISLANABİLİR GRANÜL (WG)

Aktif Maddenin Adı : % 30 Metalik bakıra eşdeğer bakrokalsiklorür
ve bakır sülfat + %13.3(ağ/ağ)mancozeb + %4 cymoxanil



Mildiyö (Phytophthora infestans)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu (g/100 l su)	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Patates	Mildiyö (Phytophthora infestans)	250 g/da	21
Domates	Mildiyö (Phytophthora infestans)	250 g/da	3
Bağ*	Mildiyö (Plasmopara viticola)	300g/100 l su g/da	28

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanmaz.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Patates, Domates-Mildiyö: Mildiyönün her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. Havaların sıcak ve kuru geçtiği yerlerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, yağışlı yerlerde ise birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ-Mildiyö: Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanmadığı yörelerde mücadeleye hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunluğuna ulaştığında yapılmalıdır. Hastalık için koşullar uygun olduğunda 2. ve diğer ilaçlamalara devam edilmelidir. Hastalık için uygun koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı istasyonlarının bulunduğu yörelerde ise ilaçlamalar için yapılacak bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Bilinen birçok ilaçla karşıabilir. Ancak uygulayıcı sorumluluğunda bir ön deneme yapılması önerilir.

