



PUTİN

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Aktif Madenin Adı : 250 g / l Azoxystrobin



Bağ Mildiyöü (*Plasmopora viticola*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Bağ *	Bağ Mildiyöü (<i>Plasmopora viticola</i>) Külleme (<i>Uncinula necator</i>) Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>)	75 ml/100 l su	21 gün
Hıyar	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml/ 100 l su	3 gün
	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/ 100 l su	3 gün
Kabak	Kabakgillerde Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/ 100 l su	3 gün
Domates (Tarla)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria Solani</i>)	75 ml/ 100 l su	3 gün
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	75 ml/ da	3 gün
Biber (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml/ 100 l su	3 gün
Çeltik	Çeltik Yanıklığı (<i>Pyricularia oryzae</i>)	100 ml/da	28 gün

Bağ Mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır, ikinci ve sonraki ilaçlamalar ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır. **Bağ Küllemesi:** Kimyasal mücadelesi 1. ilaçlama Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında 2. ilaçlama Çiçek taç yaprakları döküldüğünde 3. ve diğer ilaçlamalar ikinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. **Bağ Ölükol:** Kış ilaçlaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılır. **Yaz ilaçlaması:** 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır. **Hıyar Mildiyö:** ilaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. **Hıyar ve Kabak külleme:** ilaçlama bitkiler bitkiler kol atmaya başladığında, ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. **Domates:** Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesi veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. **Domates Erken Yaprak yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır. **Biber (sera) Külleme:** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanır ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. **Karpuz Erken Yaprak Yanıklığı:** Kimyasal ilaçlamaya yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. **Çeltik Yanıklığı:** Pyricularia oryzae Hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilacın etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci ve üçüncü ilaçlama uygulanmalıdır.

KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:

PUTİN'in domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez. Primicarb, Lambda-cyhalothrin ve Chlorothanil ile karıştırılabilir.

