



YANKEE WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)
Aktif Maddelerin Adı : % 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Domates (Sera)			
Patlıcan (Sera)	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150g/100 l su	3
Biber (Sera)			
Domates (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60g/100 l su	3
Çilek	Kurşuni Küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150g/100 l su	3
Kayısı	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100g/100 l su	7
Kiraz	Çiçek Monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	75g/100 l su	7
Şeftali			

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Domates (sera) Kurşuni küf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya domateste 2-3 çiçek salkımının oluştuğu dönemde, geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Patlıcan (Sera) ve Biber (Sera) Kurşuni küf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya domateste 2-3 çiçek salkımının oluştuğu dönemde, geç kalınmadan ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Domates (Sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre tekrar ilaçlamaya karar verilmelidir.

Çilek Kurşuni Küf: 1. ilaçlama; İlk çiçeklerin %10' u açınca, 2. ilaçlama; Çiçeklerin %50'si açınca, 3. ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kayısı, Kiraz ve Şeftali Çiçek Monilyası: 1. ilaçlama; Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama; Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Dimethomorph, Mancozeb, Metiram Kompleks, Alphacypermethrin, Cymoxanil, Metiram etkili maddeli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

