



G. CASSANDRA WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL
Aktif Maddelerin Adı : % 55 Metiram + %5Pyraclostrobin



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	200g/100 l su	28
	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	200g/100 l su	28
	Ölü Kol (<i>Phomopsis Viticola</i>)	150g/100 l su	28
Hıyar (Serada)	Mildiyö (<i>Pseudomonas cubensis</i>)	250g/100 l su	7
Domates (Serada)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200g/100 l su	3
Karpuz (Örtüaltı)	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	200g/da	7

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

Hem değme (kontakt) hem de lokal-sistemik etkili bir fungusittir, iki farklı etki şekline sahip etkin maddeler nedeniyle, her direnc yönetimi, hem de IPM'e uygundur. İyi bir kalıcı etkisi vardır. Spor çimlenmesini engellemede çok etkilidir, koruyucu olarak ve aynı zamanda hastalık gelişiminin erken döneminde kullanılmaktadır. Hastalıkların ilaçlara karşı direnc oluşumunu engellemek için Genagro Cassandra WG'yi farklı etki şekline sahip ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanınız.

İLACIN KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

Bağ Küllemesi: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. ilaçlama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. Ve diğer ilaçlamalar üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Mildiyö: İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm boya ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler gözönüne alınarak 10-15 ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Ölü Kol:*Yaz İlaçlaması

1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. ilaçlama 8-10 cm olduğunda, 3. ilaçlama da sürgünler 25- 30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domates (sera) Mildiyö: İlaçlı mücadele çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kü gibi örtünün görülmesi veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Hıyar (sera) Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler bitkiler kol atmaya başladığında, ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuz (sera) Alternarya Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce karışım testi tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması gerekmektedir.

