



BİOCURE 25 WP

İSLANABİLİR TOZ (WP)
Aktif Maddenin Adı : % 25 Tebuconazole



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu (g/100 l su)	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Domates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	50 g/100 l su	7
Armut	Kara leke (<i>venturia pirina</i>)	25 g/100 l su	14
Kayısı	Monilya (<i>sclerotinia laxa</i>)	60 g/100 l su	14
Hububat	Sarı Pas (<i>puccinia striiformis</i>)	75 g/da	-
	Septorya (<i>septoriatritici</i>)		

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek, yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan ilaç su havanın serin ve sakın olduğu zamanlarda koruyucu olarak veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 10-14 gün aralıklarla doğruca bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.

Armut:

1. Çiçek gözleri kabardığında
2. Çiçek rozet döneminde
3. Çiçek taç yapraklarının % 80, i dökülünce, hava durumuna bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir

Kayısı:

1. Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte)
2. Tam Çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte)

Hububat:

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır. Şartlar hastalık için uygun giderse 10-14 gün arayla ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Genagro Biocure 25 WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gerekir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarına karıştırılmaz.

