



COSTİGAN 490EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Maddenin Adı : 400 g/l Prochloraz + 90 g/l Propiconazole



KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Buğday	Külleme (<i>Erysiphe graminis f.sp.tritici</i>)	125 ml/da	42
	Pas (<i>Puccinia striiformis</i>) (<i>P.recondita tritici</i>) (<i>P.graminis tritici</i>)	125 ml/da	42
Şeker Pancarı	Külleme (<i>Erysiphe polygon</i>)	125 ml/da	42
	Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	125 ml/da	42

KULLANMA ZAMAN VE ŞEKLİ:

Buğdayda külleme: Hastalık belirtileri görülmeye başladığında veya bitki ve tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanır

Buğdayda pas: Hastalığın her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görünmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlk ilaçlamanın ardından 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlar, dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir.

