



GRİNGO

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Aktif Maddenin Adı : 75 g / l Mesotrione + 30 g / l Nicosulfuron



KULLANILDIĞI BİTKİ ve KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>) İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Yabani bamyâ (<i>Hibiscus trionum</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinocloa colonum</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.	35 gün

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece ve gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız. Yaprak gübrelere ve sıvı gübrelere karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonürea'li bileşiklerle tank kanisimi şeklinde kullanılmamalıdır.

