



TİCTANG

SÜSPO - EMÜLSİYON (SE)
Aktif Maddenin Adı : 452.42 g / 12.4 Ethylhexyl Ester +
6.25 g / 1 Florasulam



Yabani hardal(*Sinapis arvensis*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (GÜN)
Buğday Arpa	Kan damlası(<i>Adonis aestivalls</i>), Siğir dili(<i>Anchusa azurea</i>), Yatık boya kökü(<i>Asperugo procumbens</i>), Taşkesen otu(<i>Buglossoides arvensis</i>), Sarı ot(<i>Boreava orientalis</i>), Rum yalancı keteni(<i>Camelina rumelica</i>), Yabani tere(<i>Cardaris draba</i>), Boynuz otu(<i>Crastium dicathomum</i>), Uzun süpürge otu(<i>Descurainai sophia</i>), Kıraç itiri(<i>Geranium stepporum</i>), Sarkık meyveli yavru ağzı(<i>Hypecoum pendulum</i>), Yabani çivit otu(<i>Isatis tinctoria</i>), Trakya hardalı(<i>Neslia apiculata</i>), Yabani hardal(<i>Sinapis arvensis</i>), Uzun meyveli bülbul otu(<i>Sisymbrium altissimum</i>), Kaba tüylü fiğ(<i>Vicia narbonensis</i>), Adi fiğ(<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da	14
	Tarla papatyası(<i>Anthemis fumarifolia</i>), Saka dikenli(<i>Carduus picnocephalus</i>), Tarla hazerani(<i>Consolida regalis</i>), Boynuzlu yoğurt otu(<i>Galium tricornutum</i>), Çoban değneği(<i>Polygonum bellardii</i>), Tarla düğün çiçeği(<i>Ranunculus arvensis</i>) Meryem dikenli(<i>Silybum marianum</i>), Parmaklı yavşan otu(<i>Veronica triphyllos</i>)	60 ml/da	14
Buğday Arpa	Kekre(<i>Acroptilon repens</i>), Kokarot(<i>Bifora radians</i>), Gökbaş(<i>Centaurea depressa</i>) Köy göçüren(<i>Cirsium arvense</i>), Doğu ballıbabası(<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	14
Mısır*	İmam pamuğu(<i>Abutilon theophrastii</i>), Kırmızı köklü tilki kuyruğu(<i>Amaranthus retroflexus</i>), Uzun loğusa otu(<i>Aristolochia clematidis</i>), Sirken(<i>Chenopodium album</i>) Yatık sirken(<i>Chenopodium vulvaria</i>), Dil kanatan(<i>Galium aparine</i>), Gökbaş(<i>Centaurea depressa</i>), Gece sefası(<i>Ipomea stolonifera</i>), Adi soda otu(<i>Salsola kali</i>), Köpek üzümü(<i>Solanum nigrum</i>), Domuz pıtrağı(<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml/da	14
Mısır*	Kekre (<i>Acroptilon repens</i>), Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da	14

(*) Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısır yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

Genagro Tictang uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara asgari 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenilen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Donan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15°C üzerinde çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

