



BOLIVAR 116 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Maddenin Adı : 116.2 g / l Clothodim



Darican (*Echinochloa crus-galli*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)		
Pamuk	Yıllık Çimensi Otlar Darican (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darican (<i>Echinochloa colonum</i>) Kirpi Darı=Yapışkan Otu (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil Kirpi Darı (<i>Setaria viridis</i>)	75 ml/da	56		
	Çok Yıllık Otlar Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)(rizomdan)	125 ml/da			
	Kırmızı Mercimek	Kısır Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Kendi gelen Buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Kendi gelen Arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)		70 ml/da 80 ml/da	56
		Şeker Pancarı		Darican (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darican (<i>Echinochloa colonum</i>) Kısır Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Su Ayrığı (<i>Paspalum paspaloides</i>) Kanyaş (*) (<i>Sorghum halepense</i>)	
Domates	Darican (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (*) (<i>Sorghum halepense</i>)		60 ml/da 80 ml/da	28	
	Soğan		Kısır Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)		60 ml/da

(*) Tohumdan gelen kanyaşlarda

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Genagro Bolivar 116 EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendi gelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.

UYGULAMA ZAMANI:

Uygulamalar çıkış sonrası, yabancı otların 2-6 gerçek yapraklı olduğu aktif büyüme dönemlerinde yapılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. Nedelerle su altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmalı, bu koşullar ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Genagro Bolivar 116 EC, pamukta geniş yapraklı yabancı otlara etkili olan Pyriithiobac-sodium terkipli ilaçlar ile birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyriithiobac-sodium uygulaması Genagro Bolivar 116 EC, uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Bulunabilen en az % 80 mineral yağ veya bitkisel yağ+ en az % 15 emülgatör içeren yayıcı yapıştırıcılarla birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bu özelliklere uymayan yayıcı yapıştırıcı maddelerle karıştırılmamalıdır.

Lambda cyhalothrin ve Efenvalerate içeren insektisitlerle birlikte kullanılabilir.

