



CABBAR 45 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Maddelerin Adı : 45 g / l Pinoxaden + 20 g/l
Cloquintocet-mexyl (Safener)



KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu
Buğday	Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da
	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	100 ml/da
	Kuş yemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Delice (<i>Lolium perene</i>)	
Arpa	Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Buğdayın ve arpanın iki yapraklı döneminden bayrak yaprağına çıkarma başlangıcına kadar uygulanabilir. Kuraklık, don, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi bitkilerin stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumunda ilaçlamalardan kaçınılmalıdır. CABBAR 45 EC'nin uygulamasından bir saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

CABBAR 45 EC, bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile uygulama zamanları doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karşıma girecek bitki koruma ürünleri ilaçlama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalı, CABBAR 45 EC önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler 7 gün sonra; hormon içerikli herbisitler önce uygulanmışsa CABBAR 45 EC, 21 gün sonra uygulanmalıdır.

