



CANARIA 25 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Maddenin Adı : 250 g / l Oxadiazon



KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Karanfil	Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kazayağı - Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Fare Kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Serçe Dili (<i>Stellaria media</i>) Yabani Hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>) Eşek Marulu (<i>Sonchus spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa spp.</i>)	400 ml/da Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra, ot çıkışı başlamadan önce

İLACIN KULLANILMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Dekara en az 50 l su kullanılmalı ve toprak yüzeyi, düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde ilacın film tabakasının bozulmaması için toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Damlama sulama düzeni yoksa sulamada süzgeç kullanılmalıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer herbisitlerle bir karışım engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte fiziksel karışılabilirlik bakımından bir ön test yapılması önerilir.

