



TOPSTAR 240 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Maddelerin Adı : 240 g / l Clodinafop - propargyl
60 g / l Cloquintocet - mexyl (safener)



Yabancı yulaf= Şifanak (*Avena sterilis*, *A. fatua*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Buğday	<i>Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)</i> <i>Kısır yabancı yulaf (Avena sterilis)</i> <i>Delice (Lolium temulentum)</i> <i>Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)</i> <i>Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)</i> <i>Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor)</i>	20 ml/da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

GENEL BİLGİLER

Genagro Topstar240EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır ilaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ila 3 hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saatsonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (Safener) metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Genagro Topstar 240 EC nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM ŞEKLİ: Genagro Topstar 240 EC yelpaze hüzmeli meme ile dekara 20-litre su kullanılarak traktörle çekilen pulverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada atomizer veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlûlün mütacanis dağılımı için düz yelpaze meme (püskürtme açısı 11 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlûl ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

İLACIN UYGULAMA ZAMANI: Genagro Topstar 240 EC, buğday ve yabancı otlar çıktktan sonra (postem) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Genagro Topstar 240 EC den en iyi sonuç yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüükleri devrede uygulandığında elde edilir. Genagro Topstar 240 EC' nin kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dar yapraklı yabancı otların yan sıra geniş ya praklı yabana otlar da kontrol edimek istendiğinde Genagro Topstar 240 EC Triasulfuron+Teibutryn ile karışım halinde kullanılabilir. Sulfonyleurea terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır. Genagro Topstar 240 EC buğday fungusitleri ile birlikte kullanılabilir.

