



SAKAI 450 CS

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)
Aktif Maddenin Adı : 450 g / l Pendimethalin



KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu
Soğan	<i>Adana pancarı (Beta adanensis)</i> <i>Adi Yavşan otu (Veronica hederifolia)</i> <i>Çatal otu (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Çoban değneği (Polygonum aviculare)</i> <i>Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)</i> <i>Darıcan (Echinochloa crus-galli)</i> <i>Fare kulağı (Anagallis arvensis)</i> <i>Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Kısır Yabancı yulaf (Avena sterilis)</i> <i>Semizotu (Portulaca oleracea)</i> <i>Sirken (Chenopodium album)</i> <i>Şahtere (Fumaria officinalis)</i> <i>Şeytan elması (Datura stramonium)</i> <i>Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)</i> <i>Yapışkan ot (Setaria verticillata)</i>	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Pamuk	<i>Benekli darıcan (Echinochloa colonum)</i> <i>Çatal otu (Digitaria sanguinalis)</i> <i>Darıcan (Echinochloa crus-galli)</i> <i>Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)</i> <i>Hint kenevir (Cochorus olitorius)</i> <i>Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)</i> <i>Köpek üzümü (Solanum nigrum)</i> <i>Semiz otu (Portulaca oleracea)</i> <i>Sirken (Chenopodium album)</i> <i>Şeytan elması (Datura stramonium)</i> <i>Yapışkan ot (Setaria verticillata)</i> <i>Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)</i>	300 ml/da Ekim öncesi

Genagro Sakai 450 CS, yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenme sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış otları kontrol etmez. Genagro Sakai 450 CS, dekara 20-40 L su ile uygulanır.

KULLANMA ŞEKLİ:

Soğan: Genagro Sakai 450 CS iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır. Yelpaze tipi meme takılmış yer aletleri aracılığıyla 3 atm basınçla dekara 20-40 lt su kullanılarak uygulanmalıdır.

Pamuk: Genagro Sakai 450 CS ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. İlaçlamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.

KURAK KOŞULLARDA Genagro Sakai 450 CS UYGULAMASINI TAKİP EDEN 3-7 GÜN İÇERİSİNDE 5-10 mm SULAMA YAPILMALIDIR.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Genagro Sakai 450 CS ilaçlamadan sonra ekilebilecek bitkiler.

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve saçsırtlan bitkiler. **6 ay sonra:** Diğer bitkiler. Herhangi bir nedenle ilaçlanan tarla bozukluğunda: **Toprak 15 cm işlenerek:** Buğday, arpa, pamuk, patates, soya ve bezelye. **Toprak işlenmeden:** Mısır, fasulye ve bezelye. **İlaçın hazırlanışı:** Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar su dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Başka ilaçlarla karıştırılarak uygulanması tavsiye edilmez.

