



İSABELLA 20 SP

SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)
Aktif Madde ve Oranı : % 20 Acetamiprid



Beyaz sinek (*Bemisia tabaci*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Dönem(Gün)
Pamuk	Yaprak biti (zenk) (<i>Aphis gossypii</i>)	10 g/da (larva, ergin)	-
	Yaprak piresi (<i>Empoasca spp.</i>)	10 g/da (nimf, ergin)	
	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	40 g/da (larva, ergin)	
Tütün	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	10 g/da (nmf, ergin)	10
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 g/da (larva, ergin)	7
Domates (Tarla)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/da (larva, ergin)	3
Domates (Sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	30 g/ 100 l su (larva, ergin)	3
Antep Fıstığı	Yaprak psillidi (<i>Agonoscena targionii</i>)	20 g/ 100 l su (ergin, nimf)	7
Elma	Yeşil yaprak biti (<i>Aphis pom</i>)	20 g/da (ergin, nimf)	14
Karpuz	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/da (ergin, nimf)	7
Biber (Sera)	Şeftali yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	25 g/ 100 l su (ergin, nimf)	3

İLACIN ÖZELLİKLERİ:

İsabella 20 SP sistemik etkili bir ilaçtır. Başlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ile 21 gün korur.

İLACIN KULLANILMA ŞEKLİ:

- İlaçlamalar çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır.
- İlaçlama yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungusit ve yaprak gübrelereyle uygulanabilir.

