



TACZOATE SC 240

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Aktif Madde ve Oranı : 240 g/l Spirodiclofen



KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Dönem (GÜN)
Elma	Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi)	30 ml / 100 l su (yumurta,nimf,ergin)	14
	Ak Diken Akarı (Tetranychus viennensis)	25 ml / 100 l su (nimf,ergin)	14
Kiraz	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae)	25 ml / 100 l su (nimf,ergin)	14
Bağ *	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae)	25 ml / 100 l su (nimf,ergin)	14
Şeftali	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae)	25 ml / 100 l su (nimf,ergin)	14

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ:

Önce gereken miktarda ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarınsına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Uygulama Zamanı: Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey(nimf,ergin) görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.**Elmada Avrupa Kırmızı Örümceği**'ne karşı yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır. Kirazda ilaçlamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır. Bağda yaprak başına 15-20 aktif hareketli birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer ilaçların formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi bir karışım testi yapılmalıdır. Yayıcı yapıştırıcı karıştırılmasına gerek yoktur.

