



TORRES 350 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Aktif Madde ve Oranı : 240 g/l Imidacloprid



Pamuk yaprak biti (*Aphis gossypii*)

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Dönem (Gün)
Pamuk	Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>)	35 ml/da (nimf-ergin)	14
	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	85 ml/da (nimf-ergin)	
	Yaprak piresi (<i>Empoasca decipiens</i>)	35 ml/da (nimf-ergin)	
Armut	Armut yaprak pireleri (<i>Cacopsylla spp.</i>)	40 ml/100 l su(nimf-ergin)	14
Şeftali	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/100 l su(nimf-ergin)	14
Elma	Yaprak biti (<i>Aphis pomi</i>)	20 ml/100 l su(nimf-ergin)	14
Domates	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/100 l su(nimf-ergin)	7
	Tel kurtları (<i>Agriotes spp.</i>) Beyaz sinek	100 ml/da	
Domates (sera)	Tütün beyaz sineği (<i>Bemisia tabaci</i>) (sera)	100 ml/da (nimf-ergin) damlama sulama ile	14
Tütün	Yaprak biti (<i>Myzus persicae</i>)	12 ml/da (nimf-ergin)	
	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	14 ml/da (nimf-ergin) 50 ml/da (nimf-ergin) can suyu ile	
A. Fıstığı	Yaprak psillidi (<i>Agonoscena targionii</i>)	30 ml/100 l su(nimf-ergin)	14
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	15 ml/da (ergin-larva)	14
Patlıcan	Yaprak biti (<i>Aphis fabae</i>)	20 ml/100 l su(nimf-ergin)	7
Patlıcan (Sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>) (sera)	100 ml/da (nimf-ergin) damlama sulama ile	
Fasulye	Yaprak biti (<i>Aphis fabae</i>)	20 ml/100 l su(nimf-ergin)	7

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

YEŞİL AKSAM İLAÇLAMASI: Gerekli miktar ilaç, yarıısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kaptan önce karıştırılarak karıştırılıp depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir ve karıştırılır. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

KÖK BOĞAZI İLAÇLAMASI: Domateste tel kurtlarına karşı; önce bir dekarlık bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlül hesabıyla bir dekar kullanılabilecek su miktarı bulunur. Belirlenen su miktarı bir kap içerisinde konur ve 100 ml ilaç konularak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kökboğazına 100-150 ml gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir. (dozda) bir tank içine karıştırılarak bir kaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaç mahlülün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama

DAMLAMA SULAMA İLAÇLAMASI: Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da yapılmış patlıcanlarda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.

CAN SUYU UYGULAMASI: Tütün fideleri şaşırtılırken önce birim alana giden can suyu miktarı belirlenir. Belirlenen bu su miktarına dekar 50 ml ilaç gelecek şekilde gerekli miktar ilaç fide dikim makinesinin deposuna can suyu ile karıştırılarak verilir. İlaçlı suyun bitkilere eşit dağılımının sağlanması için muslukların ayarları tüm uygulama sırasında eşit tutulur.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

