



## ZULMET COMBİ

ISLANABİLİR TOZ (WP)  
Aktif Maddenin Adı : % 70 Propineb + %6 Cymoxanil



### KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Hıyar	Mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200 g/100 l su veya 200 g/da	14
Bağ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200 g/100 l su veya 200 g/da	28

#### İLACIN KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Gerekli miktar ilaç Önce az bir miktar su ile ayrı bir kaptan bulamaç haline getirilir. Bu bulamaç yarıya kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aletinin deposuna aktarılır. Sonra depo su ile tamamenlanır.

**Hıyarda Mildiyö:** İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve ilaçlama aralığı 7 günü geçmemelidir. İlaçlamalar bitkinin her tarafının kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İklim şartlarına göre ilaçlamalara devam edilmeli ve bu konuya resmen önerilen diğer ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

**Bağda Mildiyö:** Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde, birinci ilaçlama sürgünler 25-30 cm boy aldığında yapılmalıdır. 15 günlük aralıklarla ikinci ve üçüncü ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları hastalığın seyrine uygun gidiyorsa ilaçlamalara devam edilir. Tahmin ve uyarı sistemi uygulanıyorsa ilaçlama anonslar dikkate alınarak yapılır.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmak istenirse on karışım testi yapılmalıdır.

