



SONDUET ULTRA

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)
Aktif Maddenin Adı : 310 g / l Thiophanate-methyl +
187 g / l Epoxiconazole



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Şeker Pancarı	Yaprak Lekesi Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml/da	28
Buğday	Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	60 ml/da	35
	Külleme (<i>Erysiphe graminis f.sp.tritici</i>)	60 ml/da	
	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	60 ml/da	

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ:

Sistemik özellikte koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungusitir. ilaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Cercospora yaprak lekesi hastalığı , şeker pancarının yaşlı yapraklarında %5 lekelenme sınırına ulaşıldığında ilaçlanmaya başlanmalıdır ve 15-20 gün arayla tekrarlanmalıdır. Buğday'da Sarı Pas hastalığında ilk belirtiler görülmeye başlandığında ilk ilaçlama, ilk ilaçlamadan 21-28 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Epidemiy ihtimali varsa 3. ilaçlama yapılabilir. Buğday küllemesi ve Septorya yaprak lekesi hastalıklarında ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

