



CUNTA 450EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Aktif Madenin Adı : 450 g / l Prochloraz



KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün)
Buğday ve Arpa	Tahıl Fide Yanıklığı ve Kökboğazi Çürüklüğü Hastalıkları (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Bipolaris sorokiniana</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	100 ml/da	35
Arpa	Tahıl Küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)	100 ml/da	35
Kültür Mantarı	Kültür mantarında Örümcek Ağı Hastalığı (<i>Clodobotryum dendroides</i>)	1,25 ml/m ²	10

KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday ve Arpada kök ve kök boğazi çürüklüğü; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Kültür mantarlarında Örümcek ağı; GENAGRO CUNTA 450 EC koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır.1.ilaç sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır.20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Genagro Cunta 450 EC yabancı ot bitki koruma ürünleri, diğer mantar bitki koruma ürünleri ve insektisit ile karıştırılmadan bir ön deneme yapılması önerilir.

