



G. BORDO 20 WP

İSLANABİLİR TOZ (WP)
Aktif Maddenin Adı : % 20 Metalik Bakıra Eşdeğer
Bordo Bulamacı



KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR

| Bitki Adı | Hastalık Adı | Kullanma Dozu (g/100 l su) | Son ilaçlama ile Hasat Arası Süre (Gün) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bağ* | Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>) | 500 g | 14 |
| | Ölü Kol (<i>Phomopsis viticola</i>) | 3500g(Kış uygulaması) 500g (Yaz uygulaması) | |
| Elma | Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>) | 1500 g | 14 |
| Şeftali | Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>) | 1500 g | |
| Zeytin | Halkalı Leke Hastalığı (<i>Cycloconium oleaginum</i>) (<i>Spilocaea oleagina</i>) | 1. ilaçlama 1500 g 2. ilaçlama 1000 g | 14 |
| Kayısı | Yaprak Delen (<i>Coryneum beijerinckii</i>) | 1250 g (Dormant Dönem) 625 g (Normal dönem) | |
| Domates | Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) | 400 g/da | |

(*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak alanlarda kullanılmaz.

KULLANIM ŞEKLİ:

GENAGRO BORDO 20 WP, kullanıma hazır bordo bulamacı olup, koruyucu olarak bir çok üründen çok önemli hastalığın mücadelesinde tavsiye edilen, yüksek kalite ve saflıkta ve doğrudan su ile karıştırılarak kullanılabilen bir fungustür.

Bağ Mildiyö: Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır

Ölü Kol: Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönem Yaz uygulaması: 1. ilaçlama: Sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. ilaçlama: Sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. ilaçlama: Sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Elma karaleke: Çiçek gözleri kabarmak üzere iken kullanılır

Şeftali yaprak kıvrıklığı: Tomurcuklar kabarmak üzere iken kullanılır

Zeytin halkalı leke: Marmara Bölgesi'nde 1. ilaçlama: Ekim ayının ilk yarısı, 2. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısı, Ege Bölgesi'nde 1. ilaçlama: Zeytinler sürgün vermeden önce (Şubat ayında) 2. ilaçlama Zeytinler çiçek açmadan önce (Nisan ayında), Akdeniz Bölgesi'nde 1. ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3. ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında.

Kayısı yaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (dormant dönem) 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem) 3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucunu sıyrırken yapılmalıdır. Domates mildiyö: Belirtiler görüldüğünde başlanır. 1 gün ara ile tekrarlanarak uygulanır.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU:

GENAGRO BORDO 20 WP, diğer ilaçlarla karıştırılmadan (insektisit, fungusit, bitki gelişim düzenleyicileri vs.) Tek başına kullanılmalıdır.

